

## Instrukcja pobrania i transportu próbki kału do badania bakteriologicznego

1. Próbkę kału należy pobrać możliwie najszybciej po zaistnieniu **podejrzenia zakażenia przewodu pokarmowego** (wkrótce po wystąpieniu biegunki), **przed podaniem leków przeciwbakteryjnych lub co najmniej po 7 dniach od zakończenia kuracji antybiotykowej**.  
Najbardziej wiarygodny wynik badania uzyskuje się wtedy, gdy w dostarczonej próbce znajduje się krew bądź śluz (jeśli są obecne w oddawanym kale).
2. Kał należy oddać do czystego, wyparzonego wrzątkiem naczynia, można wykorzystać również talerz jednorazowego użytku a w przypadku małych dzieci jednorazową pieluszkę.
3. Za pomocą łopatkę znajdującą się w plastikowym pojemniku do kału (do nabycia w aptece) pobrać z kilku miejsc stolca porcję kału w ilości nie większej niż 1/3 pojemnika.
4. Pojemnik dokładnie zamknąć, opisać imieniem i nazwiskiem osoby, od której materiał został pobrany, datą i godziną pobrania oraz umieścić w foliowym woreczku. Pojemnik z próbką do badania należy transportować w pozycji pionowej w sposób uniemożliwiający uszkodzenia (zgniecenie, pęknięcie) pojemnika.
4. Pobraną próbkę niezwłocznie dostarczyć do laboratorium. Dopuszcza się krótkotrwałe przechowywanie próbki w temperaturze lodówki (4 – 8°C).
5. Do badanej próbki wypełnić czytelnie i dokładnie „Zlecenie na badanie” (do pobrania <http://wsse-poznan.pl/?p=397> lub w Punkcie Przyjmowania Prób Stacji Sanepid na ul. Nowowiejskiego 60 w Poznaniu), w którym należy podać m.in. dane osobowe i kierunek lub dołączyć, jeśli dotyczy, skierowanie od lekarza.

Przyjęcie prób: poniedziałek 8 – 14, wtorek do piątek 8 – 13  
Odbiór wyników: poniedziałek 8 – 17, wtorek do piątek 8 – 15