

Instrukcja pobrania i transportu wycieru okołodbytniczego do badań w kierunku owsicy

1. Wycier pobiera się rano przed wypróżnieniem i umyciem się pacjenta za pomocą gotowego zestawu (próbówka wraz z umocowaną w korku bagietką owiniętą celofanem), który można otrzymać w Punkcie Przyjmowania Prób Stacji Sanepid na ul. Nowowiejskiego 60 w Poznaniu.
2. Po rozchyleniu pośladek koniec bagietki z celofanem wprowadzić do odbytu na głębokość 1 – 2 cm i kilkakrotnie przekręcić, dokonując tym samym zeszkrobin z fałdów odbytu. Nie zaleca się zwilżania celofanu wodą ani jakimkolwiek płynem.
3. Bagietkę z celofanem umieścić w próbówce w ten sposób, aby celofan nie dotykał ścianek.
4. Probówkę opisać imieniem i nazwiskiem osoby, od której wycier został pobrany oraz datą pobrania. Próbkę do badania należy transportować w sposób uniemożliwiający uszkodzenia (zgniecenie, pęknięcie) próbówki.
5. Wycier dostarczyć do laboratorium oraz wypełnić czytelnie i dokładnie „Zlecenie na badanie” (do pobrania <http://wsse-poznan.pl/?p=397> lub w Punkcie Przyjmowania Prób Stacji Sanepid na ul. Nowowiejskiego 60 w Poznaniu), w którym należy podać m.in. dane osobowe i kierunek badania lub dołączyć, jeśli dotyczy, skierowanie od lekarza.

Przyjęcie prób: poniedziałek 8 – 14, wtorek do piątek 8 – 13
Odbiór wyników: poniedziałek 8 – 17, wtorek do piątek 8 – 15